

# COSAVET DF®

FUNGICIDA

ENXOFRE 80% WG

A força da  
natureza!



# COSAVET DF®

FUNGICIDA

**Fungicida à base de enxofre (80%) para o controlo do ódio de várias culturas**

**Ferramenta usada na gestão de resistências**

Atua por contacto com efeito vapor, de forma:


### Preventiva

Impedindo a germinação de conídeos durante a fase de contaminação





### Curativa

Eliminando os micélios durante a fase de colonização



Pelo seu modo de ação “multi-sítio”, o COSAVET DF® representa a ferramenta perfeita para manter a eficácia dos programas de luta contra o ódio

### Formulação exclusiva de qualidade



Processo de formulação exclusivo de Sulphur Mills Ltd., líder mundial na formulação de enxofre.

Assegurando uma dispersão em água instantânea e homogénea.

**Facilidade no manuseamento**

+  
**Seguro para o operador**  
+  
**Eficaz para a cultura**

### Registado em numerosas culturas

Cultura	Doença	Dose Kg/ha	I.S.
Vinha	Ódio	4 – 12,5	28 dias
Aveia, cevada, centeio e trigo		8	35 dias
Beterraba sacarina e beterraba forrageira		7,5	-
Lúpulo		5	28 dias
Damasqueiro, Pessegoiro e Nectarina		5	-
Macieira, pereira, marmeiro, nespereira e pêra nashi		3 - 7,5	-
Abóbora, aboborinha (courgette), melancia, meloeiro e pepino (incluindo cournichon)			-
Morango		5	-
Ervilha			-
Tomate, pimento e beringela			-

### Características técnicas

**Composição:**  
80% Enxofre

**Formulação:**  
WG – grânulos dispersíveis em água

**Embalagens:**  
400 gr, 10 kg e 25 kg

AV nº: 0901

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Não aplicar COSAVET DF com produtos à base de captana em variedades de maçã vermelha, em mistura ou em alternância quando o intervalo entre aplicações for inferior a 7 dias.
- Não aplicar COSAVET DF em variedades sensíveis a produtos que contenham enxofre, por exemplo, na variedade de pessegoiro Bergeron e nas variedades de macieira d'Anjou e Cornice.
- Devido ao risco de ocorrência de fitotoxicidade, não aplicar COSAVET DF com temperaturas superiores a 30°C.
- Fora do período invernal, respeitar um intervalo de 2 semanas entre a aplicação de COSAVET DF e a aplicação de produtos à base de óleo.
- COSAVET DF não deve ser misturado com óleos ou produtos que contenham óleos minerais.