teppeki®

Inseticida sistemico para controlo
do sugador-de-pinhas: *Leptoglossus occidentalis*

BELCHIM
CROP PROTECTION

Perfil do produto

Principio attivo: *Flonicamid a (500 g/Kg)*
Formulação: *Granulos dispersíveis WG*
Classificaçao CLP: *Sem classificação*
Intervalo de segurança: *3 dias*



O sugador-de-pinhas

Insecto sugador que se alimenta de pinhas e flores de diversas espécies do género pinus, entre as quais o Pinheiro Manso. O inseto introduz a armadura bocal por baixo das "escamas " das pinhas e suga o endosperma das sementes, podendo destruir até 75% das sementes, "sem causar sintomas exteriores visíveis". Presente em todo o país, é um problema que preocupa cada vez mais a fileira do Pinhão.

Modo de acção unico

Flonicamida actua por contacto e ingestão em larvas, ninfas e adultos. Uma vez ingerido e/ou absorvida, o insecto cessa imediatamente a alimentação morrendo 3-5 dias após. A Flonicamida penetra rápidamente na planta. Possui sistemia acropeta e actividade translaminar, o que contribui para a sua elevada eficácia e persistência de acção, e resist~encia à lavagem



Aliado gestão Resistências

A flonicamida tem um modo de acção distinto de todos os insecticidas, sendo determinante numa estratégia de gestão anti-resitências.
De acordo com o IRAC a flonicamida pertence ao grupo 29 , sendo a unica substância deste grupo, com um modo de ação distinto dos insecticidas neonicotinoides, piretroides ou qualquer outro.



Sistemia acropeta **Translaminare**

- **Excelente eficácia em aplicações preventivas**
- **Proteção das novas folhas**
- **Persist~encia de acção de 3 semanas a 1 mês**

Excelente Perfil para o Homem e Ambiente

O TEPEKKI é um produto sem classificação toxicológica CLP, seguro para o Homem e meio Ambiente, Respeita a maioria dos insectos auxiliares .

Tepekki não deixa resíduos no pinhão

Produto e é seguro para o consumidor não deixando resíduos no pinhão

Recomendações de aplicação

Estima-se que em Portugal o insecto tenha 2-3 gerações, as posturas iniciam-se final primavera. Passa por 5 estadios ninfais.

- As aplicações devem ser feitas preventivamente, no incio de cada geração a partir estadio BBCH13.
- Para proteger os insectos polinizadores não aplicar em periodos de floração

Pinha: estragos causados pelo sugador-de-pinhas

Belchim Crop Protection Portugal
Rua da Oliveira, 37 - 2º | 3080-074 Figueira da Foz