teppeki®

- Elevada persistência (de 3 semanas a 1 mês)
- Excelente performance mesmo em condições de chuva ou altas temperaturas
- Sem resistências cruzadas
- Excelente eficácia em aplicações preventivas
- Protege as novas folhas
- Respeita os polinizadores e insetos auxiliares
- Seguro para o Homem e meio ambiente

Proteger a planta na época do botão rosa é determinante para o êxito no combate aos afídeos. Deverá aí posicionar o primeiro tratamento.

Recomendações de aplicação por cultura

Cultura	Pragas controladas	Dose g/ha	Condições de aplicação	Intervalo de segurança
Pessegueiro e nectarina	*Mysus persicae; Brachicaudos schwartzy (=persicae)*	120 - 140	Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga ou seguir as recomendações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, quando existirem. A persistência do produto é de 14 a 21 dias. Número máximo de aplicações por ciclo vegetativo são 2. Utilizar a dose superior para elevadas pressões da praga.	14 dias
Cerejeira (UM)	*Myzus cerasi*	120 - 140	Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga ou seguir as recomendações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, quando existirem. A persistência do produto é de 14 a 21 dias. Número máximo de aplicações por ciclo vegetativo são 2. Utilizar a dose superior para elevadas pressões da praga.	14 dias
Ameixeira (UM)	*Aphis spiraecola, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus persicae, Brachycaudus prunicola, Hyalopterus pruni, Myzus persicae*	120 - 140	Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga ou seguir as recomendações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, quando existirem. A persistência do produto é de 14 a 21 dias. Número máximo de aplicações por ciclo vegetativo são 2. Utilizar a dose superior para elevadas pressões da praga.	14 dias

Belchim Crop Protection Portugal
Av. do Brasil 2E, loja 6 | 3080-323 Figueira da Foz
www.belchim.pt

teppeki®

Os afideos acabam, os auxiliares e polinizadores não!

BELCHIM
CROP PROTECTION

Perfil do produto



Composição: *50% p/p Flonicamida*

Formulação: *grânulos dispersíveis em água (WG)*

Insecticida *específico*

Grupo químico : *IRAC – grupo 29*

Classificação toxicológica CLP: *sem classificação*

Culturas: *macieira, pereira, pessegueiro, nectarina, laranjeira, tangerineira.*

Usos menores: ameixeira, cerejeira, abóbora, melancia, tomate de estufa, arroz.

Autorização de venda : *nº: 0803 concedida pela DGAV*

teppeki®

Excelente eficácia sobre as principais espécies de afídeos

Piolho verde

Piolho negro

TEPPEKI um aliado na gestão risco de resistências

Teppeki® pertence a um grupo químico totalmente novo, IRAC grupo 29, é a unica substância pertencente a este grupo, com um modo de ação distinto dos insecticidas neonicotinoides, piretroides ou qualquer outro.



Translaminar

TEPPEKI : Modo de ação único

A Flonicamida atua por contacto e ingestão em larvas, ninfas e adultos. Uma vez ingerido e/ou **absorvido por contacto**, vai bloquear a ingestão dos alimentos e o inseto cessa imediatamente a alimentação (1 hora após), morrendo 3-5 dias depois.

A Flonicamida penetra rapidamente na planta, e possui uma sistemia acroptal e atividade translaminar, o que contribuiu para a sua elevada eficácia e persistência de ação.

Sistemia acroptal



Produto Seguro para o Homem e meio ambiente

Respeito pelos auxiliares e polinizadores

Teppeki® é um aficida específico, sendo seletivo para os predadores naturais dos afídeos. É de todos os aficidas específicos o mais seguro para os insectos e artropodes auxiliares.

Produto em linha com as modernas exigências de uma agricultura sustentável

Teppeki é selectivo para a maioria dos auxiliares, como por exemplo:

Adalia bipunctata
Amblyseius californicus
Amblyseius cucumeris
Amblyseius degenerans
Amblyseius swirskii
Anthocoris nemoralis
Aphidius colemani
Aphidoletes aphidimyza
Apis mellifera
Atheta coriaria
Bombus terrestris
Chrysoperla carnea
Coccinella septempuntata
Cryptolaemus montruizieri
Encarsia formosa
Episyrphus balteatus
Hypoaspis miles
Hypoaspis miles &
aculeifer
Kampidromus aberrans
Macrolophus caliginosus
Nesidiocoris tenuis
Orius laevigatus
Phytoseiulus persimilis
Typhlodromus pyri

Recomendações de aplicação

- Volumes de calda recomendado: macieira, pereira, pessegueiro, nectarina, cerejeira, ameixa: 500 a 1000 L/ha; laranjeira e tangerineira: 500 a 2000 L/ha;
- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro com o mesmo modo de ação mais de três vezes por ciclo cultural em macieira, pereira, pessegueiro e nectarina, duas vezes em laranjeira, tangerineira, cerejeira e ameixa. Se o problema persistir deve ser realizado um tratamento com um produto com diferente modo de ação.
- Não utilizar em laranjeira e tangerineira para transformação. Não aplicar em limoeiros.