

Fungicida para o controlo da podridão cinzenta em videira, moniliose em cerejeira e damasqueiro, podridão cinzenta em morangueiro, esclerotínia em colza, linho, papoila dormideira e mostrada (ar livre).

COMPOSIÇÃO: Suspensão concentrada (SC) com 400g/L de isofetamida
Autorização de venda n° 1161 concedida pela DGAV

MODO DE AÇÃO

KENJA é um fungicida à base de isofetamida, de contacto, atuando como inibidor do enzima succinato desidrogenase (SDHI), bloqueando o transporte de electrões no complexo II da cadeia respiratória mitocondrial, impedindo a germinação dos esporos e o crescimento do tubo germinativo. Pertence ao Grupo químico: phenyl-oxo-ethyl thiophene amide, FRAC grupo: C2, SDHI - INIBIDOR DO SUCINATO DESIDROGENASE.

Possui efeito sobre o crescimento do micélio e da esporulação de alguns patogénios, o Kenja deve ser aplicado preventivamente para se conseguir manter o alto nível de resultados.

Kenja tem mobilidade translaminar permitindo que se mova de uma superfície para a outra da folha, dando uma maior resistência a lavagem, e protegendo mais eficazmente toda a planta, com maior persistência. Tem uma excelente eficácia no campo e um posicionamento flexível.

Kenja tem ação sobre todas as fases do ciclo da podridão cinzenta.

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	ALVO	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Videira (uvas de mesa e uvas para vinificação)	Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	187,5 – 375 mL/hl não ultrapassando	Realizar um único tratamento por ciclo cultural, a partir do fim da floração até próximo

		a dose de 1,5 L/ha	da colheita (BBCH61 a BBCH85). Utilizar um volume de calda entre 400 e 800 L/ha.
Damasqueiro e Cerejeira	Moniliose (<i>Monilia laxa</i>)	80 - 160 ml/hL, não ultrapassando a dose de 0,8 L/ha	Realizar no máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, a partir do início da floração (BBCH57 a BBCH69), com um intervalo de 9 a 10 dias. Utilizar um volume de calda entre 500 e 1000 L/ha.
Morangueiro (ar livre e estufa)	Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>):	150 – 300 ml/hl, não ultrapassando a dose de 1,2 l/ha	Realizar no máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, ao aparecimento das primeiras flores e durante o período de colheita (BBCH60 a BBCH87), com um intervalo de 7 a 10 dias. Utilizar um volume de calda entre 400 e 800 L/ha.
Colza, linho, papoila dormideira e mostarda (ar livre)	Esclerotínia (<i>Sclerotinia sp</i>)	0,8 l/ha.	Realizar um único tratamento por ciclo cultural, à floração (BBCH60 a BBCH65. Utilizar um volume de calda de 300 L/ha.

O Kenja é um produto muito selectivo

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Aplicar KENJA de acordo com as indicações para o controle das diferentes doenças e durante a fase de crescimento indicado para as diversas culturas mencionadas neste rótulo.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro da mesma família mais de duas (2) vezes por ano (damasqueiro, cerejeira e morangueiro) e por cultura (1 única vez no caso da videira, colza, linho, papoila dormideira e mostarda). Aconselha-se a sua alternância com fungicidas com diferentes modos de ação.

INTERVALO DE SEGURANÇA

CULTURA	INTERVALO SEGURANÇA (DIAS)
Morangueiro (ar livre e estufa)	1 DIA
Damasqueiro e cerejeira	7 DIAS
Videira (uvas de mesa e uvas para vinificação)	21 DIAS

COMO APLICAR ?

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas), com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP) :



GHS09

- Palavra-sinal (CLP) : **Atenção**
- Advertências de perigo (CLP) : H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Recomendações de prudência (CLP) : P102 - Manter fora do alcance das crianças.
P391 - Recolher o produto derramado.
P501 - Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P273 - Evitar a libertação para o ambiente.
- Frases EUH : EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
EUH208 - Contém (1,2-benzisotiazol)3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH401- Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.
- Frases adicionais : SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
Spe3: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
SPoPT5: No caso da videira, impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas durante 5 dias após a aplicação.
SPPT1: A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.
Este produto destina-se ao uso profissional.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, Telef.: 808 250 143.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar por acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Titular da autorização de venda:	DISTRIBUIDO POR
ISK Biosciences Europe NV PEGASUS PARK DE KLEETLAAN 12 B – BUS 9 1831 DIEGEM BÉLGICA	Belchim Crop Protection Portugal, Unipessoal, Lda Rua da Oliveira, 37 - 2º 3080-074 Figueira da Foz Telef. 233109482 www.belchim.pt

Embalagens: 11

Esta ficha técnica é uma ficha informativa que não dispensa a leitura atenta do rótulo do produto.